

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B. P. n° 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément n° 1 au Bulletin technique n° 106 de juillet 1969 - 1969-17

- AVERTISSEMENTS -

ARBRES FRUITIERS

- Tordeuse orientale du pêcher :

Le deuxième vol des papillons se poursuit toujours alors que les risques de passage des chenilles sur les pêches deviennent de plus en plus importants.

a) Protection des pêches :

- Variétés dont la maturité surviendra à partir des tout derniers jours du mois (après le 27) : appliquer dès réception un produit à base de mévinphos, à raison de 50 g de matière active à l'hectolitre.
- Variétés mûrissant à partir du 5 août et sur toutes les autres variétés, appliquer dès réception l'un des produits mentionnés dans l'Edition spéciale à la rubrique "Tordeuse orientale du pêcher", à l'exception du mévinphos.

b) Protection des pousses en pépinières et sur jeunes arbres en formation :

Renouveler sans attendre, si ce n'est déjà fait, le traitement conseillé par le bulletin 106 du 2 juillet.

VIGNE

- Mildiou :

Le temps de ces derniers jours, plus favorable à la vigne, a permis un développement relativement rapide des raisins qui deviennent moins sensibles à la maladie. Toutefois les risques d'atteintes de Rot brun persistent, en particulier dans les plantations où de nombreuses taches sont observées.

Il serait prudent d'appliquer, dès réception, un traitement généralisé à toutes les vignes de la Circonscription.

- Black-rot :

Le traitement dirigé contre le mildiou sera efficace contre le Black-rot.

- Tordeuses de la grappe :

- Eudemis : Les premières éclosions importantes de chenilles de seconde génération vont débuter incessamment en secteurs précoces de la Circonscription.

Dans les régions de Ste-Cécile, St-Laurent (Tarn) un traitement devrait être appliqué dès à présent dans toutes les vignes sensibles,

Dans les autres régions, attendre la fin de la semaine en cours pour intervenir.

- Cochylis : Lorsque les attaques constatées lors de la première génération de che-

P.1484

nilles ont été essentiellement le fait de la Cochylis, traiter seulement vers la fin de la semaine en cours en secteurs précoces et tout au début de la semaine du 21 au 27, ailleurs.

- INFORMATIONS -

ARBRES FRUITIERS

- Araignée rouge (*Panonychus ulmi*) :

Une nouvelle recrudescence d'activité de cette araignée est constatée depuis quelque temps. Dans les vergers où l'envahissement est tel que des dégâts commencent à se manifester, intervenir avec un acaricide d'été.

CULTURES LEGUMIERES

- Melon :

Le temps devient favorable au développement de l'Oïdium alors que des taches de Cladosporiose ont été identifiées en divers lieux.

Il serait prudent d'effectuer un nouveau traitement mixte à base de Manèbe et de soufre.

- Mildiou de la pomme de terre (tous départements y compris l'Aveyron) :

Nous rappelons les termes de notre précédent bulletin.

- Procéder au défanage des cultures attaquées lorsqu'un stade de tubérisation satisfaisant est atteint.
- Dans les autres cultures (Aveyron notamment) il serait utile d'appliquer un nouveau traitement dès réception.

- Mildiou et alternaria de la tomate :

Renouveler le traitement conseillé dans notre bulletin du 2 juillet.

REMARQUE IMPORTANTE

Il est expressément recommandé de veiller scrupuleusement au respect de la législation concernant les limites d'emploi des produits.

BALMA, le 15 juillet 1969

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

L. IMBERT